

Erkrankung	Material	Infektionsweg	Persönlicher Schutz	Maßnahmen
AIDS-Vollbild HIV+(positiv)	Blut, Sperma, Muttermilch, Liquor, Vaginalsekret	Blut-Kontakt mit erregerhaltigem Material über offene (evtl. unbemerkte!) Wunden	Schutzkittel, Handschuhe, ggf. Mund-Nase-Schutz und Schutzbrille	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacilloi® Wipes- 5 Minuten
Amöbenruhr	Kot (Fäzes)	Fäkal-orale Schmierinfektion	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacilloi® Wipes - 15 Minuten
Botulismus	Toxine in Konservendosen	Aufnahme mit der Nahrung	Dienstkleidung	Keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich
Brucellose	Blut, Eiter, Fruchtwasser, Muttermilch	Aufnahme mit der Nahrung, Blut-Kontakt mit erregerhaltigem Material über offene Wunden	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacilloi® Wipes - 15 Minuten
Cholera	Kot (Fäzes) Erbrochenes	Fäkal-orale Schmierinfektion	Schutzkittel, Handschuhe	Meldung an Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Vorgaben und bis dahin Stilllegung des KFZ
Creutzfeld- Jakob- Erkrankung	Nervengewebe, Liquor	Blut-Kontakt zu erregerhaltigem Material über offene Wunde	Schutzkittel, Handschuhe	Meldung an Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Vorgaben und bis dahin Stilllegung des KFZ



Erkrankung	Material	Infektionsweg	Persönlicher Schutz	Maßnahmen
Diphtherie	Respiratorische Sekrete, Eiter, Wundsekret	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nase-Schutz (auch für den Patienten), Impfschutz	Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Bacillol® Wipes - 15 Minuten
Enteritis infektiosa (Brech-Durchfall) z. B. Noro-Virus	Kot (Fäzes) Erbrochenes Urin	Fäkal-orale Schmierinfektion, Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz (FFP2)	Wischdesinfektion des Fahrzeugs mit Bacillol® Wipes - 15 Minuten CAVE: bei unklarem Erreger
CDT Clostridium difficile toxin EHEC Enterohämorrhagischer E. coli	Kot (Fäzes)	Fäkal-orale Schmierinfektion	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Mikrobac® Virucidal Tissues – 10 Minuten
Epiglottitis mit Hämophilus influenza	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillol® Wipes - 15 Minuten
Früh-Sommer-Meningo-Enzephalitis (FSME)	möglicherweise Nervengewebe, Liquor	Übertragung durch Zecken	Dienstkleidung, Impfschutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillol® Wipes - 15 Minuten CAVE: anderer Erreger möglich
Gasbrand	Eiter, Kot (Fäzes)	Kontakt von Wunden zu erregerhaltigem Material	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Mikrobac® Virucidal Tissues- 10 Minuten



Erkrankung	Material	Infektionsweg	Persönlicher Schutz	Maßnahmen
Gonorrhoe	Eiter, genitaler Ausfluss	Blut-Kontakt zu erregerehaltigem Material	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacilloi® Wipes - 5 Minuten
Hämorrhagisches Fieber	Blut, Urin, respiratorische Sekrete	Kontaktinfektion, Tröpfcheninfektion	Vollschutzanzug, Mund-Nasen-Schutz (FFP3) für den Patienten	Meldung an Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Vorgaben, und bis dahin Stilllegung des KFZ
Hepatitis A/E	Kot (Fäzes), Urin, evtl. Blut	Fäkal-orale Schmierinfektion	Dienstkleidung, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacilloi® Wipes - 5 Minuten
Hepatitis B/C/D	Blut, Sekrete, Sperma, Vaginalsekret	Blut-Blut-Kontakt, Blut-Kontakt zu erregerehaltigem Material	Dienstkleidung, Handschuhe, Impfschutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacilloi® Wipes - 5 Minuten
Herpes	Genital-, Wund- und respiratorische Sekrete	Schmierinfektion	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacilloi® Wipes - 5 Minuten
Influenza	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacilloi® Wipes - 15 Minuten
Legionellose (Pneumonie)	Respiratorische Sekrete	Übertragung durch Wasseraerosole	Dienstkleidung, Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen Bacilloi® Wipes – 5 Minuten
Lues	Blut, Eiter, Sekrete von Infektionsherden	Blutkontakt zu erregerehaltigem Material	Dienstkleidung, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen Bacilloi® Wipes – 5 Minuten



Erkrankung	Material	Infektionsweg	Persönlicher Schutz	Maßnahmen
Lyme-Borreliose		Übertragung durch Zecken	Dienstkleidung, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen Bacillo® Wipes – 5 Minuten
Malaria	Blut	Blut-Blut-Kontakt	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen Bacillo® Wipes – 5 Minuten
Masern	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillo® Wipes - 15 Minuten
Meningitis Enzephalitis Myelitis	Liquor, Kot (Fäzes), Blut, Nasen-Rachen-Sekret	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nase-Schutz	Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Bacillo® Wipes - 15 Minuten
Milzbrand	Respiratorische Sekrete, Kot (Fäzes), Wundsekrete	Übertragung vom Tier auf den Menschen, Kontakt mit erregerehaltigem Material	Vollschutzanzug, bei Lungenmilzbrand Mund-Nasen-Schutz (FFP3) für den Patienten	Meldung an das Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Vorgaben und bis dahin Stilllegung des KFZ
Mononukleose (Pfeiffersches Drüsenfieber)	Respiratorische Sekrete, Speichel, Tränenflüssigkeit	Tröpfcheninfektion, Schleimhautkontakt	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz für den Patienten	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillo® Wipes - 5 Minuten
M(O)RSA MRGN / ESBL VRE / CPE Noro-Virus	Eiter, Blut, Urin, Kot (Fäzes), Liquor, respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion, Schleimhautkontakt, Schmierinfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz (auch für den Patienten)	Wischdesinfektion kontaminierter Flächen mit Bacillo® Wipes Fahrzeug - 15 Minuten Kontaktflächen - 5 Minuten Patient und handnahe Flächen



Erkrankung	Material	Infektionsweg	Persönlicher Schutz	Maßnahmen
Mumps	Respiratorische Sekrete, Tränenflüssigkeit, Speichel, Blut, Liquor, Urin	Tröpfcheninfektion, Speichelkontakt	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nase-Schutz (auch für den Patienten)	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillo® Wipes - 5 Minuten
Ornithose	Respiratorische Sekrete	Übertragung durch Vogelkot und kontaminiertem Staub	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillo® Wipes - 5 Minuten
Pertussis (Keuchhusten)	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillo® Wipes - 15 Minuten
Pest	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion, Übertragung durch Rattenfloh	Vollschutzanzug, Mund-Nasen-Schutz (FFP3) für den Patienten	Meldung an das Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Vorgaben und bis dahin Stilllegung des KFZ
Poliomyelitis	Kot (Fäzes), respiratorische Sekrete	Fäkal-orale Schmierinfektion, Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz, Impfschutz	Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Bacillo® Wipes- 15 Minuten
Rotaviren (Gastroenteritis)	Kot (Fäzes)	Fäkal-orale Schmierinfektion	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillo® Wipes - 15 Minuten



Erkrankung	Material	Infektionsweg	Persönlicher Schutz	Maßnahmen
Röteln	Respiratorische Sekrete, Blut, Urin, Kot (Fäzes)	Tröpfcheninfektion, Kontakt mit erregerehaltigem Material	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillol® Wipes - 15 Minuten
SARS	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion	Vollschutzanzug, Mund-Nasen-Schutz (FFP3) für den Patienten	Meldung an das Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Anweisung und bis dahin Stilllegung des KFZ
Scharlach	Respiratorische Sekrete, Eiter, Genitalsekrete	Tröpfcheninfektion, Kontakt mit erregerehaltigem Material	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillol® Wipes - 15 Minuten
Skabies (Milbenkrätze)	Hautschuppen	Hautkontakt	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillol® Wipes - 15 Minuten
Tetanus	Wundsekret	Sporeninokulation bei Verletzungen und offenen Wunden	Schutzkittel , Handschuhe, Impfschutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Mikrobac® Virucidal Tissues- 0 Minuten
Tollwut	Respiratorische Sekrete, Speichel, Tränenflüssigkeit, Eiter	Kontakt offener Wunden mit erregerehaltigem Material	Vollschutzanzug	Meldung an das Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Anweisung und bis dahin Stilllegung des KFZ



Erkrankung	Material	Infektionsweg	Persönlicher Schutz	Maßnahmen
Toxoplasmose	Liquor, Blut	Infektion über Tiere, Kontakt mit erregerhaltigem Material	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillo® Wipes - 5 Minuten
Tuberkulose (offen)	Respiratorische Sekrete, Blut, Eiter, Kot (Fäzes), genitale Sekrete	Tröpfcheninfektion, Kontakt- und Schmierinfektion mit erregerhaltigem Material	Schutzkittel, Handschuhe, FFP 2-Maske Mund-Nasen-Schutz für den Patienten	Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Bacillo® Wipes - 30 Minuten
Tuberkulose (geschlossen)	siehe oben	siehe oben	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillo® Wipes - 30 Minuten
Typhus abdominalis und Paratyphus	Kot (Fäzes), Blut, Urin, Galle, Erbrochenes, Eiter	Fäkal-orale Schmierinfektion, Kontakt zu erregerhaltigem Material	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Bacillo® Wipes - 15 Minuten
Varizellen (Windpocken und Herpes Zoster)	Nasen-Rachen-Sekret, Liquor, Krusten/Borken	Tröpfcheninfektion, Schmierinfektion über Wundsekrete und Bläscheninhalt	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Bacillo® Wipes - 15 Minuten

Lutz Cierpka

Geschäftsführer

Michael Dräger, DEAA

Facharzt für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin

Ärztlicher Leiter

