

| Erkrankung | Material | Infektionsweg | Persönlicher Schutz | Maßnahmen |
|-------------------------------------|--|---|--|---|
| AIDS-Vollbild HIV+(positiv) | Blut, Sperma, Muttermilch, Liquor, Vaginalsekret | Blut-Kontakt mit erregerhaltigem Material über offene (evtl. unbemerkte!) Wunden | Schutzkittel, Handschuhe, ggf. Mund-Nase-Schutz und Schutzbrille | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 1 h |
| Amöbenruhr | Kot (Fäzes) | Fäkal-orale Schmierinfektion | Schutzkittel, Handschuhe | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 1h |
| Botulismus | Toxine in Konservendosen | Aufnahme mit der Nahrung | Dienstkleidung | Keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich |
| Brucellose | Blut, Eiter, Fruchtwasser, Muttermilch | Aufnahme mit der Nahrung, Blut-Kontakt mit erregerhaltigem Material über offene Wunden | Schutzkittel, Handschuhe | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 30 Minuten |
| Cholera | Kot (Fäzes) Erbrochenes | Fäkal-orale Schmierinfektion | Schutzkittel, Handschuhe | Meldung an Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Vorgaben, bis dahin Stilllegung des Fahrzeugs |
| Creutzfeld- Jakob- Erkrankung | Nervengewebe, Liquor | Blut-Kontakt zu erregerhaltigem Material über offene Wunde | Schutzkittel, Handschuhe | Meldung an Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Vorgaben, bis dahin Stilllegung des Fahrzeugs |



| Erkrankung | Material | Infektionsweg | Persönlicher Schutz | Maßnahmen |
|---|--|--|---|---|
| Diphtherie | Respiratorische Sekrete, Eiter, Wundsekret | Tröpfcheninfektion | Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nase-Schutz (auch für den Patienten), Impfschutz | Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Optisept® 2% - 1h |
| Enteritis infektiosa (Brech-Durchfall) z. B. Noro-Virus | Kot (Fäzes) Erbrochenes Urin | Fäkal-orale Schmierinfektion, Tröpfcheninfektion | Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz (FFP2) | Wischdesinfektion des Fahrzeugs mit Optisept® 2% - 1h CAVE: bei unklarem Erreger |
| CDT Clostridium difficile toxin EHEC Enterohämorrhagischer E. coli | Kot (Fäzes) | Fäkal-orale Schmierinfektion | Schutzkittel, Handschuhe | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 30 Minuten |
| Epiglottitis mit Hämophilus influenza | Respiratorische Sekrete | Tröpfcheninfektion | Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 1h |
| Früh-Sommer-Meningo-Enzephalitis (FSME) | möglicherweise Nervengewebe, Liquor | Übertragung durch Zecken | Dienstkleidung, Impfschutz | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 1h CAVE: anderer Erreger möglich |
| Gasbrand | Eiter, Kot (Fäzes) | Kontakt von Wunden zu erregerehaltigem Material | Schutzkittel, Handschuhe | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 1h |



| Erkrankung | Material | Infektionsweg | Persönlicher Schutz | Maßnahmen |
|------------------------|---|--|---|--|
| Gonorrhoe | Eiter, genitaler Ausfluss | Blut-Kontakt zu erregerehaltigem Material | Schutzkittel, Handschuhe | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 30 Minuten |
| Hämorrhagisches Fieber | Blut, Urin, respiratorische Sekrete | Kontaktinfektion, Tröpfcheninfektion | Vollschutzanzug, Mund-Nasen-Schutz (FFP3) für den Patienten | Meldung an Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Vorgaben, bis dahin Stilllegung des Fahrzeugs |
| Hepatitis A/E | Kot (Fäzes), Urin, evtl. Blut | Fäkal-orale Schmierinfektion | Dienstkleidung, Handschuhe | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 1h |
| Hepatitis B/C/D | Blut, Sekrete, Sperma, Vaginalsekret | Blut-Blut-Kontakt, Blut-Kontakt zu erregerehaltigem Material | Dienstkleidung, Handschuhe, Impfschutz | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 1h |
| Herpes | Genital-, Wund- und respiratorische Sekrete | Schmierinfektion | Schutzkittel, Handschuhe | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 1h |
| Influenza | Respiratorische Sekrete | Tröpfcheninfektion | Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 2h |
| Legionellose | Respiratorische Sekrete | Übertragung durch Wasseraerosole | Dienstkleidung, Handschuhe | Keine zusätzlichen Maßnahmen notwendig |
| Lues | Blut, Eiter, Sekrete von Infektionsherden | Blutkontakt zu erregerehaltigem Material | Dienstkleidung, Handschuhe | Keine zusätzlichen Maßnahmen notwendig |



| Erkrankung | Material | Infektionsweg | Persönlicher Schutz | Maßnahmen |
|---|---|---|---|--|
| Lyme-Borreliose | | Übertragung durch Zecken | Dienstkleidung, Handschuhe | Keine zusätzlichen Maßnahmen notwendig |
| Malaria | Blut | Blut-Blut-Kontakt | Schutzkittel, Handschuhe | Keine zusätzlichen Maßnahmen notwendig |
| Masern | Respiratorische Sekrete | Tröpfcheninfektion | Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 1h |
| Meningitis Enzephalitis Myelitis | Liquor, Kot (Fäzes), Blut, Nasen-Rachen-Sekret | Tröpfcheninfektion | Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nase-Schutz | Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Optisept® 2% - 2h |
| Milzbrand | Respiratorische Sekrete, Kot (Fäzes), Wundsekrete | Übertragung vom Tier auf den Menschen, Kontakt mit erregerhaltigem Material | Vollschutzanzug, bei Lungenmilzbrand Mund-Nasen-Schutz (FFP3) für den Patienten | Meldung an das Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Vorgaben bis dahin Stilllegung des Fahrzeugs |
| Mononukleose (Pfeiffersches Drüsenfieber) | Respiratorische Sekrete, Speichel, Tränenflüssigkeit | Tröpfcheninfektion, Schleimhautkontakt | Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz für den Patienten | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 1h |
| M(O)RSA MRGN / ESBL VRE / CPE Noro-Virus | Eiter, Blut, Urin, Kot (Fäzes), Liquor, respiratorische Sekrete | Tröpfcheninfektion, Schleimhautkontakt, Schmierinfektion | Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz (auch für den Patienten) | Wischdesinfektion kontaminierter Flächen mit Optisept® Fahrzeug 2% - 30 Minuten Kontaktflächen 2% - 15 Minuten Patient und handnahe Flächen |



| Erkrankung | Material | Infektionsweg | Persönlicher Schutz | Maßnahmen |
|-----------------------------|--|---|---|--|
| Mumps | Respiratorische Sekrete, Tränenflüssigkeit, Speichel, Blut, Liquor, Urin | Tröpfcheninfektion, Speichelkontakt | Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nase-Schutz (auch für den Patienten) | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 1h |
| Ornithose | Respiratorische Sekrete | Übertragung durch Vogelkot und kontaminiertem Staub | Schutzkittel, Handschuhe | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 1h |
| Pertussis (Keuchhusten) | Respiratorische Sekrete | Tröpfcheninfektion | Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 30 Minuten |
| Pest | Respiratorische Sekrete | Tröpfcheninfektion, Übertragung durch Rattenfloh | Vollschutzanzug, Mund-Nasen-Schutz (FFP3) für den Patienten | Meldung an das Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Vorgaben, bis dahin Stilllegung des Fahrzeugs |
| Poliomyelitis | Kot (Fäzes), respiratorische Sekrete | Fäkal-orale Schmierinfektion, Tröpfcheninfektion | Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz, Impfschutz | Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Optisept® 2% - 1h |
| Rotaviren (Gastroenteritis) | Kot (Fäzes) | Fäkal-orale Schmierinfektion | Schutzkittel, Handschuhe | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 1 h |



| Erkrankung | Material | Infektionsweg | Persönlicher Schutz | Maßnahmen |
|------------------------|---|---|---|--|
| Röteln | Respiratorische Sekrete, Blut, Urin, Kot (Fäzes) | Tröpfcheninfektion, Kontakt mit erregerehaltigem Material | Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 2h |
| SARS | Respiratorische Sekrete | Tröpfcheninfektion | Vollschutzanzug, Mund-Nasen-Schutz (FFP3) für den Patienten | Meldung an das Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Anweisung, bis dahin Stilllegung des Fahrzeugs |
| Scharlach | Respiratorische Sekrete, Eiter, Genitalsekrete | Tröpfcheninfektion, Kontakt mit erregerehaltigem Material | Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 30 Minuten |
| Skabies (Milbenkrätze) | Hautschuppen | Hautkontakt | Schutzkittel, Handschuhe | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 1h |
| Tetanus | Wundsekret | Sporeninokulation bei Verletzungen und offenen Wunden | Schutzkittel, Handschuhe, Impfschutz | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 1h |
| Tollwut | Respiratorische Sekrete, Speichel, Tränenflüssigkeit, Eiter | Kontakt offener Wunden mit erregerehaltigem Material | Vollschutzanzug | Meldung an das Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Anweisung, bis dahin Stilllegung des Fahrzeugs. |



| Erkrankung | Material | Infektionsweg | Persönlicher Schutz | Maßnahmen |
|--|--|---|--|---|
| Toxoplasmose | Liquor, Blut | Infektion über Tiere, Kontakt mit erregerhaltigem Material | Schutzkittel, Handschuhe | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 2% - 1h |
| Tuberkulose (offen) | Respiratorische Sekrete, Blut, Eiter, Kot (Fäzes), genitale Sekrete | Tröpfcheninfektion, Kontakt- und Schmierinfektion mit erregerhaltigem Material | Schutzkittel, Handschuhe, FFP 2-Maske Mund-Nasen-Schutz für den Patienten | Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Optisept® 4% - 1h |
| Tuberkulose (geschlossen) | siehe oben | siehe oben | Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz | Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Optisept® 4% - 1h |
| Typhus abdominalis und Paratyphus | Kot (Fäzes), Blut, Urin, Galle, Erbrochenes, Eiter | Fäkal-orale Schmierinfektion, Kontakt zu erregerhaltigem Material | Schutzkittel, Handschuhe | Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Optisept® 2% - 1h |
| Varizellen (Windpocken und Herpes Zoster) | Nasen-Rachen- Sekrete, Liquor, Krusten/Borken | Tröpfcheninfektion, Schmierinfektion über Wundsekrete und Bläscheninhalt | Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz | Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Optisept® 2% - 2h |

Lutz Cierpka

Geschäftsführer

Michael Dräger, DEAA

Facharzt für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin

Ärztlicher Leiter

