

Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen vor / während / nach Krankentransporten infektiöser Patienten entsprechender Erkrankung
URK Haupt Stand Juli 2011

Erkrankung	Material	Infektionsweg	Persönlicher Schutz	Maßnahmen
AIDS-Vollbild HIV+(positiv)	Blut, Sperma, Muttermilch, Liquor, Vaginalsekret	Blut-Kontakt mit erregerhaltigem Material über offene (evtl. unbemerkte!) Wunden	Schutzkittel, Handschuhe, ggf. Mund-Nase-Schutz und Schutzbrille	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Biguanid Fläche N [®] 0,5% - 1h
Amöbenruhr	Kot (Fäzes)	Fäkal-orale Schmierinfektion	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Biguanid Fläche N [®] 0,5% - 1h
Botulismus	Toxine in Konservendosen	Aufnahme mit der Nahrung	Dienstkleidung	Keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich
Brucellose	Blut, Eiter, Fruchtwasser, Muttermilch	Aufnahme mit der Nahrung, Blut-Kontakt mit erregerhaltigem Material über offene Wunden	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Biguanid Fläche N [®] 0,5% - 1h
Cholera	Kot (Fäzes) Erbrochenes	Fäkal-orale Schmierinfektion	Schutzkittel, Handschuhe	Meldung an Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Vorgaben, bis dahin Stilllegung des Fahrzeugs
Creutzfeld- Jakob- Erkrankung	Nervengewebe, Liquor	Blut-Kontakt zu erregerhaltigem Material über offene Wunde	Schutzkittel, Handschuhe	Meldung an Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Vorgaben, bis dahin Stilllegung des Fahrzeugs

Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen vor / während / nach Krankentransporten infektiöser Patienten entsprechender Erkrankung
 URK Haupt Stand Juli 2011

Erkrankung	Material	Infektionsweg	Persönlicher Schutz	Maßnahmen
Diphtherie	Respiratorische Sekrete, Eiter, Wundsekret	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nase-Schutz (auch für den Patienten), Impfschutz	Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Biguanid Fläche N [®] 0,5% - 1h
Enteritis infektiosa (Brech-Durchfall) Noro-Virus	Kot (Fäzes) Erbrochenes Urin	Fäkal-orale Schmierinfektion, Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz (FFP2)	Wischdesinfektion des Fahrzeugs mit Biguanid Fläche N [®] 1% - 2h
CDT Clostridium difficile toxin EHEC Enterohämorrhagischer E. coli	Kot (Fäzes)	Fäkal-orale Schmierinfektion	Schutzkittel, Handschuhe	Kontaktflächendesinfektion mit Biguanid Fläche N [®] 2% - 5 Minuten
Epiglottitis mit Hämophilus influenza	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Biguanid Fläche N [®] 0,5% - 1h
Früh-Sommer-Meningo-Enzephalitis (FSME)	möglicherweise Nervengewebe, Liquor	Übertragung durch Zecken	Dienstkleidung, Impfschutz	Keine zusätzliche Maßnahmen notwendig
Gasbrand	Eiter, Kot (Fäzes)	Kontakt von Wunden zu erregerrhaltigem Material	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Biguanid Fläche N [®] 0,5% - 1h

CAVE: bei unklarer Gastroenteritis immer Desinfektion mit Biguanid Fläche N[®] 1% - 2 Stunden , da evtl. Noro-Virus vorliegen könnte

Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen vor / während / nach Krankentransporten infektiöser Patienten entsprechender Erkrankung
 URK Haupt Stand Juli 2011

Erkrankung	Material	Infektionsweg	Persönlicher Schutz	Maßnahmen
Gonorrhoe	Eiter, genitaler Ausfluss	Blut-Kontakt zu erregerehaltigem Material	Schutzkittel, Handschuhe	Keine zusätzlichen Maßnahmen
Hämorrhagisches Fieber	Blut, Urin, respiratorische Sekrete	Kontaktinfektion, Tröpfcheninfektion	Vollschutzanzug, Mund-Nasen-Schutz (FFP3) für den Patienten	Meldung an Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Vorgaben, bis dahin Stilllegung des Fahrzeugs
Hepatitis A/E	Kot (Fäzes), Urin, evtl. Blut	Fäkal-orale Schmierinfektion	Dienstkleidung, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Biguanid Fläche N [®] 0,5% - 1h
Hepatitis B/C/D	Blut, Sekrete, Sperma, Vaginalsekret	Blut-Blut-Kontakt, Blut-Kontakt zu erregerehaltigem Material	Dienstkleidung, Handschuhe, Impfschutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Biguanid Fläche N [®] 0,5% - 1h
Herpes	Genital-, Wund- und respiratorische Sekrete	Schmierinfektion	Schutzkittel, Handschuhe	Keine zusätzlichen Maßnahmen notwendig
Influenza	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Biguanid Fläche N [®] 2% - 4h
Legionellose	Respiratorische Sekrete	Übertragung durch Wasseraerosole	Dienstkleidung, Handschuhe	Keine zusätzlichen Maßnahmen notwendig
Lues	Blut, Eiter, Sekrete von Infektionsherden	Blutkontakt zu erregerehaltigem Material	Dienstkleidung, Handschuhe	Keine zusätzlichen Maßnahmen notwendig

Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen vor / während / nach Krankentransporten infektiöser Patienten entsprechender Erkrankung
URK Haupt Stand Juli 2011

Erkrankung	Material	Infektionsweg	Persönlicher Schutz	Maßnahmen
Lyme-Borreliose		Übertragung durch Zecken	Dienstkleidung, Handschuhe	Keine zusätzlichen Maßnahmen notwendig
Malaria	Blut	Blut-Blut-Kontakt	Schutzkittel, Handschuhe	Keine zusätzlichen Maßnahmen notwendig
Masern	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Biguanid Fläche N [®] 1% - 2h
Meningitis Enzephalitis Myelitis	Liquor, Kot (Fäzes), Blut, Nasen-Rachen-Sekret	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nase-Schutz	Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Biguanid Fläche N [®] 2% - 4h
Milzbrand	Respiratorische Sekrete, Kot (Fäzes), Wundsekrete	Übertragung vom Tier auf den Menschen, Kontakt mit erregerehaltigem Material	Vollschutzanzug, bei Lungenmilzbrand Mund-Nasen-Schutz (FFP3) für den Patienten	Meldung an das Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Vorgaben bis dahin Stilllegung des Fahrzeugs
Mononukleose (Pfeiffersches Drüsenfieber)	Respiratorische Sekrete, Speichel, Tränenflüssigkeit	Tröpfcheninfektion, Schleimhautkontakt	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz für den Patienten	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Biguanid Fläche N [®] 0,5% - 1h
Multiresistente Erreger MRSA ESBL VRE	Eiter, Blut, respiratorische Sekrete, Liquor, Kot (Fäzes)	Tröpfcheninfektion, Schleimhautkontakt, Schmierinfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz (auch für den Patienten)	Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Biguanid Fläche N [®] Fahrzeug 0,5% - 1h Kontaktflächen 2% - 5 Minuten

Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen vor / während / nach Krankentransporten infektiöser Patienten entsprechender Erkrankung
 URK Haupt Stand Juli 2011

Erkrankung	Material	Infektionsweg	Persönlicher Schutz	Maßnahmen
Mumps	Respiratorische Sekrete, Tränenflüssigkeit, Speichel, Blut, Liquor, Urin	Tröpfcheninfektion, Speichelkontakt	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nase-Schutz (auch für den Patienten)	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Biguanid Fläche N [®] 2% - 4h
Ornithose	Respiratorische Sekrete	Übertragung durch Vogelkot und kontaminiertem Staub	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Biguanid Fläche N [®] 0,5% - 1h
Pertussis (Keuchhusten)	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Biguanid Fläche N [®] 0,5% - 1h
Pest	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion, Übertragung durch Rattenfloh	Vollschutzanzug, Mund-Nasen-Schutz (FFP3) für den Patienten	Meldung an das Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Vorgaben, bis dahin Stilllegung des Fahrzeugs
Poliomyelitis	Kot (Fäzes), respiratorische Sekrete	Fäkal-orale Schmierinfektion, Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz, Impfschutz	Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Biguanid Fläche N [®] 2% - 4h
Rotaviren (Gastroenteritis)	Kot (Fäzes)	Fäkal-orale Schmierinfektion	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Biguanid Fläche N [®] 0,25% - 15min (gesicherter Rotaviren-Befund !)

CAVE: bei unklarer Gastroenteritis immer Desinfektion mit Biguanid Fläche N[®] 1% - 2 Stunden , da evtl. Noro-Virus vorliegen könnte

Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen vor / während / nach Krankentransporten infektiöser Patienten entsprechender Erkrankung
URK Haupt Stand Juli 2011

Erkrankung	Material	Infektionsweg	Persönlicher Schutz	Maßnahmen
Röteln	Respiratorische Sekrete, Blut, Urin, Kot (Fäzes)	Tröpfcheninfektion, Kontakt mit erregerehaltigem Material	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Biguanid Fläche N [®] 2% - 4h
SARS	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion	Vollschutzanzug, Mund-Nasen-Schutz (FFP3) für den Patienten	Meldung an das Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Anweisung, bis dahin Stilllegung des Fahrzeugs
Scharlach	Respiratorische Sekrete, Eiter, Genitalsekrete	Tröpfcheninfektion, Kontakt mit erregerehaltigem Material	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Biguanid Fläche N [®] 0,5% - 1h
Skabies (Milbenkrätze)	Hautschuppen	Hautkontakt	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Biguanid Fläche N [®] 0,5% - 1h
Tetanus	Wundsekret	Sporeninokulation bei Verletzungen und offenen Wunden	Schutzkittel , Handschuhe, Impfschutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Biguanid Fläche N [®] 0,5% - 1h
Tollwut	Respiratorische Sekrete, Speichel, Tränenflüssigkeit, Eiter	Kontakt offener Wunden mit erregerehaltigem Material	Vollschutzanzug	Meldung an das Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Anweisung, bis dahin Stilllegung des Fahrzeugs.

Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen vor / während / nach Krankentransporten infektiöser Patienten entsprechender Erkrankung
 URK Haupt Stand Juli 2011

Erkrankung	Material	Infektionsweg	Persönlicher Schutz	Maßnahmen
Toxoplasmose	Liquor, Blut	Infektion über Tiere, Kontakt mit erregerhaltigem Material	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Biguanid Fläche N [®] 0,5% - 1h
Tuberkulose (offen)	Respiratorische Sekrete, Blut, Eiter, Kot (Fäzes), genitale Sekrete	Tröpfcheninfektion, Kontakt- und Schmierinfektion mit erregerhaltigem Material	Schutzkittel, Handschuhe, FFP 2-Maske Mund-Nasen-Schutz für den Patienten	Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Biguanid Fläche N [®] 2% - 4h
Tuberkulose (geschlossen)	siehe oben	siehe oben	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Biguanid Fläche N [®] 0,5% - 1h
Typhus abdominalis und Paratyphus	Kot (Fäzes), Blut, Urin, Galle, Erbrochenes, Eiter	Fäkal-orale Schmierinfektion, Kontakt zu erregerhaltigem Material	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Biguanid Fläche N [®] 0,5% - 1h
Varizellen (Windpocken und Herpes Zoster)	Nasen-Rachen-Sekret, Liquor, Krusten/Borken	Tröpfcheninfektion, Schmierinfektion über Wundsekrete und Bläscheninhalt	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Biguanid Fläche N [®] 2% - 4h

Lutz Cierpka
Geschäftsführer

Michael Dräger, DEAA
Ärztlicher Leiter