



Allgemeiner Desinfektionsplan

URK Haupt Krankentransporte Bielefeld

Stand: Januar 2019

Was	Wann, wie oft	Wie	Womit	Wer
Trage Tragestuhl	Zur wöchentlichen Fahrzeugdesinfektion Nach Gebrauch und bei Kontamination	desinfizierendes Abwischen	Flächendesinfektionsmittel Biguanid Fläche N® 0,5% - 1 Std. Bacillo® Wipes 5 Minuten	Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Wände Decken Fußboden Materialschränke Tragetisch Wandhalterungen	Zur wöchentlichen Fahrzeugdesinfektion Nach Gebrauch und bei Kontamination	desinfizierendes Abwischen	Flächendesinfektionsmittel Biguanid Fläche N® 0,5% - 1 Std. Bacillo® Wipes 5 Minuten	Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Notfallrucksack Schaufeltrage Vakuumschienen Kammerschienen Vakuummattätze	Zur wöchentlichen Fahrzeugdesinfektion Nach Gebrauch und bei Kontamination	desinfizierendes Abwischen	Flächendesinfektionsmittel Biguanid Fläche N® 0,5% - 1 Std. Bacillo® Wipes 5 Minuten	Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Stethoskop Blutdruckmessgerät Staubbinde Infusionspumpe Spritzenpumpe Pulsoximeter EKG / Defibrillator Respirator Absaugpumpe Laryngoskopgriff	Zur wöchentlichen Fahrzeugdesinfektion Nach Gebrauch und bei Kontamination	desinfizierendes Abwischen	Flächendesinfektionsmittel Biguanid Fläche N® 0,5% - 1 Std. Bacillo® Wipes 5 Minuten	Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
⇒ nach Transport meldepflichtiger Krankheiten ⇒ nach Transport von Patienten mit CDT M(O)RSA / VRE MRGN / ESBL / CPE / Noro-Virus	Sofort nach Transport Sofort nach Transport	Scheuerdesinfektion des Fahrzeugs gemäß § 18 Infektionsschutzgesetz Eigenschutz Beachten Wischdesinfektion	Vorgabe Gesundheitsamt Siehe speziellen Desinfektionsplan Flächendesinfektion aller Kontaktflächen von Patient und Personal mit Mikrobac® Virucidal Tissues Kontaktflächen 10 Minuten Bacillo® Wipes Kontaktfläche 5 Minuten Fahrzeug 15 Minuten	Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt Hygienefachkraft im RD Desinfektor Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
<u>Instrumente:</u> Magillzange Klemmen Guedeltuben Wendeltuben Mundkeil Beatmungsmasken Peep – Ventil Laryngoskopspatel Führungsstäbe Patientenventil Beatmungsschlauch (in der Regel Einmalmaterial nach Gebrauch entsorgen)	nach Gebrauch	Erst desinfizieren, dann reinigen! gebrauchte Instrumente in die Instrumenten-Desinfektionswanne einlegen, Schlauchsysteme mit Lösung füllen, Einwirkzeit beachten Nach Desinfektion Instrumente mit Leitungswasser abspülen und trocknen lassen. Vor Montage die Hände desinfizieren!	Instrumentendesinfektionsmittel Desomedan ID® 2% - 30 Min.	Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt



Allgemeiner Desinfektionsplan

URK Haupt Krankentransporte Bielefeld

Stand: Januar 2019

Was	Wann, wie oft	Wie	Womit	Wer
Hygienische Händedesinfektion	Vor Arbeitsbeginn, vor und nach Patientenkontakt, nach Kontakt mit kontaminierten Material, nach Toilettenbenutzung, bei Dienstschluss	Desinfektionsmittel aus Wandspender entnehmen 3 ml Konzentrat 30 sek. in die trockenen Hände einreiben	Hände-Desinfektionsmittel Aseptoman® 3 ml – 30 sek. Sterillium Virugard® 3 ml – 30 sek. (gegen Noro-Virus)	Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Händereinigung	Nach Verschmutzung, nach Toilettengang, nach dem Einsatz, vor Mahlzeiten	Händewaschung, abtrocknen nur mit Einmalhandtücher	Flüssigseife aus Spendern	Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Händepflege Hautschutz	Mehrmals täglich, nach Händedesinfektion, nach Händereinigung	Hautschutzlotion in die Hände einreiben	Hautschutzlotion aus Spendern	Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Hautdesinfektion	vor Injektionen, vor Punktionen, vor chirurgischen Eingriffen	Hautdesinfektionsmittel aufbringen (Spray) Hautstelle vollständig benetzen, Einwirkzeit beachten, nur sterile Tupfer verwenden	Haut-Desinfektionsmittel Cutasept F® 15 – 30 sek.	Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Einmalhandschuhe	vor jedem Patientenkontakt	Anziehen und bei Beschädigung wechseln		Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Mundschutz Augenschutz	Bei Spritzgefahr von Blut, Sekreten, bei bestimmten Infektionspatienten	selbst anlegen evtl. Patienten anlegen		Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Dienstbekleidung	Wechseln nach grober Verschmutzung und nach Dienstende	wechseln		Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Einmalmaterial: Spritzen Tupfer Kompressen Handschuhe Sauerstoffsonden	Im Einsatz Nach dem Einsatz, bzw. nach Dienstende	In flüssigkeitsdichte Abfallbeutel abwerfen Abfälle in den Hausmüll entsorgen		Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
scharfer und spitzer Abfall	Sofort nach Gebrauch ⇨ 2/3 volle Behälter ⇨	In durchstichsichere Behälter abwerfen Geschlossen im Hausmüll entsorgen		Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Putzutensilien	Nach Gebrauch	Einmaltücher entsorgen, mehrfach Putztücher desinfizierend auswaschen und trocknen		Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt

Lutz Cierpka

Geschäftsführer

Michael Dräger, DEAA
Facharzt für Anästhesiologie,
Intensivmedizin, Notfallmedizin
Ärztlicher Leiter