



# Allgemeiner Desinfektionsplan

URK HAUPT

**QM**

DIN EN ISO 9001: 2015

**Stand: März 2021**

Was	Wann, wie oft	Wie	Womit	Wer
Trage Tragestuhl	Zur wöchentlichen Fahrzeugdesinfektion  Nach Gebrauch und bei Kontamination	desinfizierendes Abwischen	Flächendesinfektionsmittel Biguanid Fläche N® 0,5% - 1 Std.  Bacillo® Wipes 5 Minuten	Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Wände Decken Fußboden Materialschränke Tragetisch Wandhalterungen	Zur wöchentlichen Fahrzeugdesinfektion  Nach Gebrauch und bei Kontamination	desinfizierendes Abwischen	Flächendesinfektionsmittel Biguanid Fläche N® 0,5% - 1 Std.  Bacillo® Wipes 5 Minuten	Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Notfallrucksack Schaufeltrage Vakuumschienen Kammerschienen Vakuummattze	Zur wöchentlichen Fahrzeugdesinfektion  Nach Gebrauch und bei Kontamination	desinfizierendes Abwischen	Flächendesinfektionsmittel Biguanid Fläche N® 0,5% - 1 Std.  Bacillo® Wipes 5 Minuten	Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Stethoskop Blutdruckmessgerät Staubbinde Infusionspumpe Spritzenpumpe Pulsoximeter EKG / Defibrillator Respirator Absaugpumpe Laryngoskopgriff	Zur wöchentlichen Fahrzeugdesinfektion  Nach Gebrauch und bei Kontamination	desinfizierendes Abwischen	Flächendesinfektionsmittel Biguanid Fläche N® 0,5% - 1 Std.  Bacillo® Wipes 5 Minuten	Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
⇒ nach Transport meldepflichtiger Krankheiten  ⇒ nach Transport von Patienten mit  <b>CDT</b>  M(O)RSA / VRE MRGN / ESBL / CPE / Noro-Virus / Corona-Virus	Sofort nach Transport       Sofort nach Transport	Scheuerdesinfektion des Fahrzeugs gemäß § 18 Infektionsschutzgesetz  Eigenschutz Beachten  Wischdesinfektion	Vorgabe Gesundheitsamt Siehe speziellen Desinfektionsplan  Flächendesinfektion aller Kontaktflächen von Patient und Personal mit  Mikroba <sup>®</sup> Virucidal Tissues Kontaktflächen 10 Minuten  Bacillo® Wipes Kontaktfläche 5 Minuten Fahrzeug 15 Minuten	Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt Hygienefachkraft im RD Desinfektor  Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
01.03.2021	M. Dräger	T.Groß	2.0	1 / 1



# Allgemeiner Desinfektionsplan

## URK HAUPT

**QM**  
DIN EN ISO 9001: 2015

<p><u>Instrumente:</u> Magillzange Klemmen Guedeltuben Wendeltuben Mundkeil Beatmungsmasken Peep – Ventil Laryngoskopspatel Führungsstäbe Patientenventil</p>	nach Gebrauch	<p>Erst desinfizieren, dann reinigen! gebrauchte Instrumente in die Instrumenten- Desinfektionswanne einlegen, Schlauchsysteme mit Lösung füllen, Einwirkzeit beachten</p> <p>Nach Desinfektion</p>	<p>Instrumenten- desinfektionsmittel Desomedan ID® 2% - 30 Min.</p>	<p>Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt</p>
Hygienische Händedesinfektion	Vor Arbeitsbeginn, vor und nach Patientenkontakt, nach Kontakt mit kontaminierten Material, nach Toilettenbenutzung, bei Dienstschluss	<p>Desinfektionsmittel aus Wandspender entnehmen</p> <p>3 ml Konzentrat 30 sek. in die trockenen Hände einreiben</p>	<p>Hände- Desinfektionsmittel Desderman pure® 3 ml – 30 sek. Sterillium Virugard® 3 ml – 30 sek. (gegen Noro-Virus)</p>	<p>Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt</p>
Händereinigung	Nach Verschmutzung, nach Toilettengang, nach dem Einsatz, vor Mahlzeiten	Händewaschung, abtrocknen nur mit Einmalhandtücher	Flüssigseife aus Spendern	<p>Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt</p>
Händepflege Hautschutz	Mehrmals täglich, nach Händedesinfektion, nach Händereinigung	Hautschutzlotion in die Hände einreiben	Hautschutzlotion aus Spendern	<p>Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt</p>
Hautdesinfektion	vor Injektionen, vor Punktionen, vor chirurgischen Eingriffen	Hautdesinfektionsmittel aufbringen (Spray) Hautstelle vollständig benetzen, Einwirkzeit beachten, nur sterile Tupfer verwenden	Haut-Desinfektionsmittel Cutasept F® 15 – 30 sek.	<p>Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt</p>
Einmalhandschuhe	vor jedem Patientenkontakt	Anziehen und bei Beschädigung wechseln		<p>Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt</p>
Mundschutz Augenschutz	Bei Spritzgefahr von Blut, Sekreten, bei bestimmten Infektionspatienten	selbst anlegen evtl. Patienten anlegen		<p>Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt</p>
Dienstbekleidung	Wechseln nach grober Verschmutzung und nach Dienstende	wechseln		<p>Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt</p>
Einmalmaterial: Spritzen Tupfer Kompressen Handschuhe Sauerstoffsonden	Im Einsatz  Nach dem Einsatz, bzw. nach Dienstende	<p>In flüssigkeitsdichte Abfallbeutel abwerfen</p> <p>Abfälle in den Hausmüll entsorgen</p>		<p>Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt</p>

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
01.03.2021	M. Dräger	T.Groß	2.0	2 / 1



# Allgemeiner Desinfektionsplan

## URK HAUPT

**QM**  
DIN EN ISO 9001: 2015

scharfer und spitzer Abfall	Sofort nach Gebrauch ⇨ 2/3 volle Behälter ⇨	In durchstichsichere Behälter abwerfen  Geschlossen im Hausmüll entsorgen		Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Putzutensilien	Nach Gebrauch	Einmaltücher entsorgen, mehrfach Putztücher desinfizierend auswaschen und trocknen		Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt

Bielefeld. 01.03.2021

**Lutz Cierpka**

**Geschäftsführer**

**Stefan Baer**  
Notfallsanitäter

**Desinfektor**

**Michael Dräger, DESA**  
Facharzt für Anästhesiologie,  
Intensivmedizin, Notfallmedizin  
**Ärztlicher Leiter**

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
01.03.2021	M. Dräger	T.Groß	2.0	3 / 1