



# Hygiene – und Desinfektionsmaßnahmen

URK HAUPT

**QM**

DIN EN ISO 9001: 2015

Hygiene – und Desinfektionsmaßnahmen vor / während / nach Krankentransporten infektiöser Patienten entsprechender Erkrankung

Stand: Januar 2023

Erkrankung	Material	Infektionsweg	Persönlicher Schutz	Maßnahmen
AIDS-Vollbild HIV+(positiv)	Blut, Sperma, Muttermilch, Liquor, Vaginalsekret	Blut-Kontakt mit erregerhaltigem Material über offene (evtl. unbemerkt!) Wunden	Schutzkittel, Handschuhe, ggf. Mund-Nase-Schutz und Schutzbrille	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillo® Wipes- 5 Minuten
Amöbenruhr	Kot (Fäzes)	Fäkal-orale Schmierinfektion	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillo® Wipes - 15 Minuten
Botulismus	Toxine in Konservendosen	Aufnahme mit der Nahrung	Dienstkleidung	Keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich
Brucellose	Blut, Eiter, Fruchtwasser, Muttermilch	Aufnahme mit der Nahrung, Blut-Kontakt mit erregerhaltigem Material über offene Wunden	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillo® Wipes - 15 Minuten

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
01.01.2023	M. Dräger	S.Baer	1.2	1 / 1



# Hygiene – und Desinfektionsmaßnahmen

URK HAUPT

QM

DIN EN ISO 9001: 2015

## Hygiene – und Desinfektionsmaßnahmen vor / während / nach Krankentransporten infektiöser Patienten entsprechender Erkrankung

Stand: Januar 2023

Cholera	Kot (Fäzes) Erbrochenes	Fäkal-orale Schmierinfektion	Schutzkittel, Handschuhe	Meldung an Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Vorgaben und bis dahin Stilllegung des KFZ
Creutzfeld-Jakob-Erkrankung	Nervengewebe, Liquor	Blut-Kontakt zu erregerehaltigem Material über offene Wunde	Schutzkittel, Handschuhe	Meldung an Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Vorgaben und bis dahin Stilllegung des KFZ

Diphtherie	Respiratorische Sekrete, Eiter, Wundsekret	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nase-Schutz (auch für den Patienten), Impfschutz	Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Bacillol® Wipes - 15 Minuten
Enteritis infektiosa (Brech-Durchfall) <b>z. B. Noro-Virus</b>	Kot (Fäzes) Erbrochenes Urin	Fäkal-orale Schmierinfektion, Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz ( <b>FFP2</b> )	Wischdesinfektion des Fahrzeugs mit Bacillol® Wipes - 15 Minuten <b>CAVE: bei unklarem Erreger</b>

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
01.01.2023	M. Dräger	S.Baer	1.2	2 / 1



# Hygiene – und Desinfektionsmaßnahmen

URK HAUPT

**QM**

DIN EN ISO 9001: 2015

## Hygiene – und Desinfektionsmaßnahmen vor / während / nach Krankentransporten infektiöser Patienten entsprechender Erkrankung

Stand: Januar 2023

CDT Clostridium difficile toxin EHEC Enterohämorrhagische r E. coli	Kot (Fäzes)	Fäkal-orale Schmierinfektion	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Mikrobac® Virucidal Tissues – 10 Minuten
Epiglottitis mit Hämophilus influenza	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillol® Wipes - 15 Minuten
Früh-Sommer- Meningo-Enzephalitis (FSME)	möglicherweise Nervengewebe, Liquor	Übertragung durch Zecken	Dienstkleidung, Impfschutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillol® Wipes - 15 Minuten  <b>CAVE: anderer Erreger möglich</b>
Gasbrand	Eiter, Kot (Fäzes)	Kontakt von Wunden zu erregerhaltigem Material	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen 10 Minuten mit Mikrobac® Virucidal Tissue

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
01.01.2023	M. Dräger	S.Baer	1.2	3 / 1



# Hygiene – und Desinfektionsmaßnahmen

URK HAUPT

**QM**

DIN EN ISO 9001: 2015

## Hygiene – und Desinfektionsmaßnahmen vor / während / nach Krankentransporten infektiöser Patienten entsprechender Erkrankung

Stand: Januar 2023

Gonorrhoe	Eiter, genitaler Ausfluss	Blut-Kontakt zu erregerehaltigem Material	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillol® Wipes - 5 Minuten
Hämorrhagisches Fieber	Blut, Urin, respiratorische Sekrete	Kontaktinfektion, Tröpfcheninfektion	Vollschutzanzug, Mund-Nasen-Schutz (FFP3) für den Patienten	Meldung an Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Vorgaben, und bis dahin Stilllegung des KFZ
Hepatitis A/E	Kot (Fäzes), Urin, evtl. Blut	Fäkal-orale Schmierinfektion	Dienstkleidung, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillol® Wipes - 5 Minuten
Hepatitis B/C/D	Blut, Sekrete, Sperma, Vaginalsekret	Blut-Blut-Kontakt, Blut-Kontakt zu erregerehaltigem Material	Dienstkleidung, Handschuhe, Impfschutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillol® Wipes - 5 Minuten
Herpes	Genital-, Wund- und respiratorische Sekrete	Schmierinfektion	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillol® Wipes - 5 Minuten

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
01.01.2023	M. Dräger	S.Baer	1.2	4 / 1



# Hygiene – und Desinfektionsmaßnahmen

URK HAUPT

**QM**

DIN EN ISO 9001: 2015

## Hygiene – und Desinfektionsmaßnahmen vor / während / nach Krankentransporten infektiöser Patienten entsprechender Erkrankung

**Stand: Januar 2023**

Influenza	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillol® Wipes - 15 Minuten
Legionellose (Pneumonie)	Respiratorische Sekrete	Übertragung durch Wasseraerosole	Dienstkleidung, Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen Bacillol® Wipes – 5 Minuten
Lues	Blut, Eiter, Sekrete von Infektionsherden	Blutkontakt zu erregerhaltigem Material	Dienstkleidung, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen Bacillol® Wipes – 5 Minuten

Lyme-Borreliose		Übertragung durch Zecken	Dienstkleidung, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen Bacillol® Wipes – 5 Minuten
Malaria	Blut	Blut-Blut-Kontakt	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen Bacillol® Wipes – 5 Minuten
Masern	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillol® Wipes - 15 Minuten

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
01.01.2023	M. Dräger	S.Baer	1.2	5 / 1





# Hygiene – und Desinfektionsmaßnahmen

URK HAUPT

QM

DIN EN ISO 9001: 2015

## Hygiene – und Desinfektionsmaßnahmen vor / während / nach Krankentransporten infektiöser Patienten entsprechender Erkrankung

Stand: Januar 2023

Meningitis Enzephalitis Myelitis	Liquor, Kot (Fäzes), Blut, Nasen- Rachen-Sekrete	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nase-Schutz	Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Bacillol® Wipes - 15 Minuten
Milzbrand	Respiratorische Sekrete, Kot (Fäzes), Wundsekrete	Übertragung vom Tier auf den Menschen, Kontakt mit erregerhaltigem Material	Vollschutzanzug, bei Lungenmilzbrand Mund- Nasen-Schutz (FFP3) für den Patienten	Meldung an das Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Vorgaben und bis dahin Stilllegung des KFZ
Mononukleose (Pfeiffersches Drüsenfieber)	Respiratorische Sekrete, Speichel, Tränenflüssigkeit	Tröpfcheninfektion, Schleimhautkontakt	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz für den Patienten	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillol® Wipes - 5 Minuten
<b>M(O)RSA</b> <b>MRGN / ESBL</b> <b>VRE / CPE</b> <b>Noro-Virus</b>	Eiter, Blut, Urin, Kot (Fäzes), Liquor, respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion, Schleimhautkontakt, Schmierinfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz (auch für den Patienten)	Wischdesinfektion kontaminierter Flächen mit Bacillol® Wipes <b>Fahrzeug</b> - 15 Minuten <b>Kontaktflächen</b> - 5 Minuten Patient und handnahe Flächen

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
01.01.2023	M. Dräger	S.Baer	1.2	6 / 1



# Hygiene – und Desinfektionsmaßnahmen

URK HAUPT

QM

DIN EN ISO 9001: 2015

## Hygiene – und Desinfektionsmaßnahmen vor / während / nach Krankentransporten infektiöser Patienten entsprechender Erkrankung

Stand: Januar 2023

Mumps	Respiratorische Sekrete, Tränenflüssigkeit, Speichel, Blut, Liquor, Urin	Tröpfcheninfektion, Speichelkontakt	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nase-Schutz (auch für den Patienten)	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillof® Wipes - 5 Minuten
Ornithose	Respiratorische Sekrete	Übertragung durch Vogelkot und kontaminiertem Staub	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillof® Wipes - 5 Minuten
Pertussis (Keuchhusten)	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillof® Wipes - 15 Minuten
Pest	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion, Übertragung durch Rattenfloh	Vollschutzanzug, Mund-Nasen-Schutz (FFP3) für den Patienten	Meldung an das Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Vorgaben und bis dahin Stilllegung des KFZ
Poliomyelitis	Kot (Fäzes), respiratorische Sekrete	Fäkal-orale Schmierinfektion, Tröpfcheninfektion	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz, Impfschutz	Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Bacillof® Wipes- 15 Minuten

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
01.01.2023	M. Dräger	S.Baer	1.2	7 / 1



# Hygiene – und Desinfektionsmaßnahmen

URK HAUPT

**QM**

DIN EN ISO 9001: 2015

## Hygiene – und Desinfektionsmaßnahmen vor / während / nach Krankentransporten infektiöser Patienten entsprechender Erkrankung

Stand: Januar 2023

Rotaviren (Gastroenteritis)	Kot (Fäzes)	Fäkal-orale Schmierinfektion	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillol® Wipes - 15 Minuten
--------------------------------	-------------	------------------------------	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Röteln	Respiratorische Sekrete, Blut, Urin, Kot (Fäzes)	Tröpfcheninfektion, Kontakt mit erregerehaltigem Material	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillol® Wipes - 15 Minuten
Covid-19	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion	Vollschutzanzug, Mund-Nasen-Schutz (FFP2) für Personal und Patienten	Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Bacillol® Wipes - 15 Minuten
Scharlach	Respiratorische Sekrete, Eiter, Genitalsekrete	Tröpfcheninfektion, Kontakt mit erregerehaltigem Material	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillol® Wipes - 15 Minuten

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
01.01.2023	M. Dräger	S.Baer	1.2	8 / 1





# Hygiene – und Desinfektionsmaßnahmen

URK HAUPT

QM

DIN EN ISO 9001: 2015

## Hygiene – und Desinfektionsmaßnahmen vor / während / nach Krankentransporten infektiöser Patienten entsprechender Erkrankung

Stand: Januar 2023

Skabies (Milbenkrätze)	Hautschuppen	Hautkontakt	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillol® Wipes - 15 Minuten
Tetanus	Wundsekret	Sporeninokulation bei Verletzungen und offenen Wunden	Schutzkittel, Handschuhe, Impfschutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Mikrobac® Virucidal Tissues-10Minuten
Tollwut	Respiratorische Sekrete, Speichel, Tränenflüssigkeit, Eiter	Kontakt offener Wunden mit erregerehaltigem Material	Vollschutzanzug	Meldung an das Gesundheitsamt und Desinfektion nach dessen Anweisung und bis dahin Stilllegung des KFZ

Toxoplasmose	Liquor, Blut	Infektion über Tiere, Kontakt mit erregerehaltigem Material	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillol® Wipes - 5 Minuten
--------------	--------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
01.01.2023	M. Dräger	S.Baer	1.2	9 / 1



# Hygiene – und Desinfektionsmaßnahmen

URK HAUPT

**QM**

DIN EN ISO 9001: 2015

## Hygiene – und Desinfektionsmaßnahmen vor / während / nach Krankentransporten infektiöser Patienten entsprechender Erkrankung

Stand: Januar 2023

Tuberkulose (offen)	Respiratorische Sekrete, Blut, Eiter, Kot (Fäzes), genitale Sekrete	Tröpfcheninfektion, Kontakt- und Schmierinfektion mit erregerehaltigem Material	Schutzkittel, Handschuhe, FFP 2-Maske Mund-Nasen-Schutz für den Patienten	Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Bacillol® Wipes - 30 Minuten
Tuberkulose (geschlossen)	siehe oben	siehe oben	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion möglicherweise kontaminierter Flächen mit Bacillol® Wipes - 30 Minuten
Typhus abdominalis und Paratyphus	Kot (Fäzes), Blut, Urin, Galle, Erbrochenes, Eiter	Fäkal-orale Schmierinfektion, Kontakt zu erregerehaltigem Material	Schutzkittel, Handschuhe	Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Bacillol® Wipes - 15 Minuten
Varizellen (Windpocken und Herpes Zoster)	Nasen-Rachen-Sekret, Liquor, Krusten/Borken	Tröpfcheninfektion, Schmierinfektion über Wundsekrete und Bläscheninhalt	Schutzkittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz	Wischdesinfektion des gesamten Fahrzeugs mit Bacillol® Wipes - 15 Minuten

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
01.01.2023	M. Dräger	S.Baer	1.2	10 / 1



# Hygiene – und Desinfektionsmaßnahmen

URK HAUPT

**QM**

DIN EN ISO 9001: 2015

Hygiene – und Desinfektionsmaßnahmen vor / während / nach Krankentransporten infektiöser Patienten entsprechender Erkrankung

Stand: Januar 2023

Bielefeld, den 01.01.2023

**Lutz Cierpka**

**Geschäftsführer**

**Stefan Baer**

Notfallsanitäter

**Desinfektor**

**Michael Dräger, DESA**

Facharzt für Anästhesiologie,  
Intensivmedizin, Notfallmedizin

**Ärztlicher Leiter**

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
01.01.2023	M. Dräger	S.Baer	1.2	11 / 1